PAS PAR GOAT

Newsletter PASPAR_GOAT n°2

I nematodi gastrointestinali Strongylida nelle aziende caprine

Le cariche parassitarie degli Strongylida sono risultate notevolmente variabili tra le capre come riportato nel grafico.



Solo il 37% delle cariche è risultato inferiore a 300 upg, valore che non viene ancora associato a un danno zootecnico.
Le differenze più che ai soggetti stessi sono dipendenti dalle stesse aziende e da fattori locali. Infatti, dall'analisi delle cariche medie aziendali sono evidenti notevoli differenze.
Il valore medio aziendale più elevato di è stato addirittura di 3398 upg.
Studi su caprini allevati in Lombardia hanno evidenziato che l'emissione di uova di parassiti è influenzata in maniera particolarmente significativa dalla razza caprina e dal numero di lattazioni e che la produzione giornaliera di latte è risultata fortemente correlata al carico di parassiti, alla razza e al numero di lattazioni.

Il progetto PASPAR_GOAT ha dimostrato cariche inferiori tra le primipare e le quintipare delle razze autoctone considerate rispetto alle razze cosmopolite.



L'allevamento di razze autoctone costituisce una risorsa non solo rispetto alle produzioni ma anche ai fini della gestione del parassitismo gastrointestinale per le aziende che effettuano pascolo.

PSR 2014 2020 LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI
Regione Lombardia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
divas DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E SCIENZE ANIMALI
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali